

**FAQ Webinaire**  
**Infos complémentaires sur la vaccination**  
**Mardi 23 février 2021**  
**À destination des médecins généralistes**

La présentation du Prof Englert reprenait les questions précédemment posées par des médecins généralistes et les réponses à y apporter.  
Cette présentation constitue déjà une FAQ en elle-même.

**PHASAGE ET ORGANISATION DE LA VACCINATION**

**Faut-il rester en quarantaine lorsque l'on en est vacciné et en contact avec une personne positive ?**

Oui, les données sur l'impact de la vaccination sur la contagiosité commencent à être connues et sont très encourageantes. Mais elles ne montrent pas une protection à 100 %. Dans le contexte actuel où le virus circule beaucoup, le fait d'être vacciné ne vous empêche pas à 100 % d'être contaminant pour un tiers. Les études montrent que les vaccins réduisent de manière drastique (2/3) le nombre de personnes qui vont excréter du virus malgré le vaccin. Et cette excrétion est en quantité et en durée réduites. On ne dispose pas encore suffisamment de données chiffrées qui permettraient de considérer que toutes les mesures de prévention peuvent être abandonnées. De plus, aujourd'hui, seuls 10 % de la population belge est vaccinée.

**Le système de vaccination est-il le même pour la région de Bruxelles-Capitale ?**

Oui, dans les grandes lignes. L'organisation est légèrement différente. Le système de convocation, quant à lui, est le même.

**Comment peut-on réactiver son code ?**

Via le call center.

**Quel est l'âge des personnes actuellement en réanimation ?**

Il s'agit des personnes âgées entre 55 et 75 ans.

**Les personnes retraitées peuvent-elles aider ?**

Oui, elles seront couvertes par l'assurance « Responsabilité professionnelle » du centre. C'est le centre qui doit les engager.

**COMMUNICATION**

**Comment expliquer la 3<sup>ème</sup> vague ?**

Il faut espérer que nous ne sommes pas au début de la 3<sup>ème</sup> vague. Néanmoins, il y a une accélération due à la prédominance du variant anglais. La contagiosité est significativement plus élevée.

## VACCINATION ET POSITIVITE

### **Faut-il dépister un patient présentant des signes Covid mais ayant déjà reçu une vaccination ?**

Oui car il peut être positif et contaminant.

### **Quel est le risque à vacciner une personne positive à la Covid ?**

Aucun risque... si ce n'est que la personne peut être malade. Elle va alors penser qu'il s'agit des effets secondaires du vaccin alors qu'il s'agit des symptômes de la Covid.

## INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

### **Qu'en est-il du désir de grossesse ?**

Par sécurité, il est recommandé de postposer de 2 mois après la vaccination l'arrêt de la contraception. C'est une sécurité. Il n'y a aucun argument de risque particulier. Mais, actuellement, nous ne disposons encore que de données relativement limitées sur la grossesse. Il n'y a pas de préférence vaccinale pour les femmes enceintes.

### **Faut-il prescrire un anticoagulant aux personnes se faisant vacciner avec le vaccin AstraZeneca ?**

Non, le risque de saignement lié à l'anticoagulation, même s'il est rarissime avec l'Asaflow, est plus fréquent que le nombre hypothétique de thromboses avec l'Astrazeneca.

### **Les immunodéprimés peuvent-ils avoir le vaccin AstraZeneca ?**

Oui, tout comme le vaccin MRNA. Par contre, les patients sous traitement avec adénovirus doivent exclusivement recevoir le vaccin MRNA.

### **Peut-on vacciner un contact à faible risque ?**

Oui, mais si il est en quarantaine, il est à haut risque et ne peut donc se rendre dans un centre de vaccination.